

## ALGORITHME POUR L'ACCUEIL CLINIQUE HGJ

Accident ischémique transitoire (AIT) suspecté s'étant manifesté il y a plus de 48 heures et moins de 14 jours

**Professionnel responsable :** Infirmière à l'Accueil Clinique de l'Hôpital général juif


**Population ciblée :** Patient référé par un médecin de famille ou infirmière praticienne spécialisée (IPS) du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, chez qui on suspecte un épisode d'AIT s'étant manifesté il y a plus de 48 heures et moins de 14 jours

**CONTRE-INDICATIONS SPÉCIFIQUES :** Diriger votre usager vers l'Urgence en présence des symptômes suivants ou d'une des conditions suivantes et/ou si l'évènement a eu lieu il y a moins de 48 heures

- Symptômes neurologiques persistants (symptômes non complètement résolus dans un délai d'une heure)
- Fièvre  $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$
- Instabilité hémodynamique (hypotension, tachycardie, perte de connaissance)
- Douleur thoracique
- Symptômes d'AIT et nouvelle/connue fibrillation auriculaire (FA) avec ou sans anticoagulant

**INDICATIONS SPÉCIFIQUES :**

- Faiblesse unilatérale transitoire du visage, du bras ou de la jambe
- Perte de vision monoculaire transitoire
- Trouble de langage réceptif ou expressif transitoire



## JGH CLINICAL ACCESS SERVICE ALGORITHM

Suspected Transient Ischemic Attack (TIA) having occurred more than 48 hours ago and less than 14 days

**Professional responsible:** Nurse clinician at the Clinical Access Service of the Jewish General Hospital

**Patient population:** Patients referred by Family Physicians or Nurse Practitioners (NP) from the West-Central Montreal CIUSSS, who experienced a suspected TIA more than 48 hours ago and less than 14 days

**SPECIFIC CONTRAINDICATIONS:** Send your user to Emergency Department if one or more of these symptoms or conditions are present and/if the event happened less than 48 hours

- Persistent stroke symptoms (symptoms have not resolved fully within 1 hour)
- Fever  $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$
- Hemodynamic instability (hypotension, tachycardia, loss of consciousness)
- Chest pain
- TIA symptoms with new/known atrial fibrillation (A-fib) treated with/without anticoagulant

### SPECIFIC INDICATIONS

- Transient unilateral weakness of face, arm or leg
- Transient monocular blindness
- Transient aphasia or dysarthria

