

Accueil clinique

Algorithme pour hématurie macroscopique asymptomatique

Professionnel responsable : Infirmière à l'Accueil clinique de l'Hôpital général juif (HGJ)


Population ciblée : Usager référé par un médecin de famille / IPS du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CCOMTL) avec hématurie macroscopique asymptomatique

CONTRE-INDICATIONS SPÉCIFIQUES POUR L'ACCUEIL CLINIQUE HGJ :

- Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, pouls $\geq 100/\text{min}$, FR $\geq 28/\text{min}$, SpO₂ $\leq 92\%$
- Hématurie macroscopique avec caillots
- Dysurie importante ou oligurie
- Douleur abdominale, pelvienne ou du flanc, aiguë non soulagée avec analgésique oral
- Globe vésical ou rétention urinaire
- Histoire de cancer urologique
- Enceinte

INDICATIONS SPÉCIFIQUES :

- Répond aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique
- Présence d'hématurie franche sans exercice récent, sans menstruation, sans activité sexuelle, sans trauma et sans exploration instrumentale récente



Développé par : Dr Maurice Anidjar, Chef du département d'Urologie, Dr Mark Lipman, Chef du département de Néphrologie

En collaboration avec: Jessica Pinto, Inf. MSCA; Dr Jed Lipes, Suzette Chung, inf., Melanie Zwetkow, inf., Bianca Rossignol, inf., Francine Aguilar, inf., Vanessa McIntyre, inf.

Version du 6 FÉVRIER 2023

Approuvé par le CMDP du CCOMTL : 6 FÉVRIER 2023


Clinical Access Service

Asymptomatic Macroscopic Hematuria Algorithm

Professional Responsible: Nurse clinician at the Clinical Access Service of the Jewish General Hospital (JGH)

Target Population: User referred by family physician/NP from the CIUSSS West-Central Montreal (CCOMTL) with asymptomatic frank hematuria

JGH CLINICAL ACCESS SERVICE SPECIFIC CONTRAINDICATIONS:	
- Fever $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$, pulse $\geq 100/\text{min}$, RR $\geq 28/\text{min}$, SpO2 $\leq 92\%$	- Palpable full bladder or urinary retention
- Gross hematuria with clots	- History of urological cancer
- Significant dysuria or oliguria	- Pregnant
- Acute abdominal, pelvic or flank pain not controlled with oral analgesics	
SPECIFIC INDICATIONS :	
- Meets general eligibility criteria of the Clinical Access Service	
- Presence of frank hematuria without recent exercise, menses, sexual activity, trauma or instrumentation	



Développé par : Dr Maurice Anidjar, Chef du département d'Urologie, Dr Mark Lipman, Chef du département de Néphrologie

En collaboration avec: Jessica Pinto, Inf. MSCA; Dr Jed Lipos, Suzette Chung, inf., Melanie Zwetkow, inf., Bianca Rossignol, inf., Francine Aguilar, inf., Vanessa McIntyre, inf.

Version du 6 FÉVRIER 2023

Approuvé par le CMDP du CCOMTL : 6 FÉVRIER 2023