

Accueil clinique

Algorithme pour hématurie microscopique asymptomatique

Professionnel responsable:

Infirmière à l'Accueil clinique de l'Hôpital général juif (HGJ)

Population ciblée:


Usager référé par un médecin de famille / IPS du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CCOMTL) avec l'hématurie microscopique sans symptômes associés

CONTRE-INDICATIONS SPÉCIFIQUES DE L'ACCUEIL CLINIQUE HGJ:

- Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, pouls $\geq 100/\text{min}$, FR $\geq 28/\text{min}$, SpO₂ $\leq 92\%$
- Dysurie importante
- Douleur abdominale, pelvienne ou du flanc aigüe non soulagée avec analgésique oral
- Histoire de cancer urologique
- Enceinte

INDICATIONS SPÉCIFIQUES :

- Répond aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique
- Présence de sang dans 2 analyses d'urine, sans exercice récent, sans menstruation, sans activité sexuelle et sans exploration instrumentale des voies urinaires



Développé par : Dr Maurice Anidjar, Chef du département d'Urologie, et Dr Mark Lipman, Chef du département de la Néphrologie

En collaboration avec : Suzette Chung, inf., Jessica Pinto, inf., MScA, Mélanie Zwetkow, inf. et Bianca Rossignol, inf., Dr Jed Lipman, Vanessa McIntyre, inf.

Version du 6 FÉVRIER 2023

Approuvé par le CMDP du CCOMTL : 6 FÉVRIER 2023


Clinical Access Service

Asymptomatic Microscopic Hematuria Algorithm

Professional Responsible: Nurse clinician at the Clinical Access Service of the Jewish General Hospital (JGH)

Target Population: User referred by family physician/NP from the CIUSSS West-Central Montreal (CCOMTL) with microscopic hematuria without associated symptoms

JGH CLINICAL ACCESS SERVICE CONTRAINDICATIONS:	
- Fever $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$, pulse $\geq 100/\text{min}$, RR $\geq 28/\text{min}$, SpO2 $\leq 92\%$	- History of urological cancer
- Significant dysuria	- Currently pregnant
- Acute abdominal, pelvic or flank pain not controlled with oral analgesics	
SPECIFIC INDICATIONS:	
- Meets general eligibility criteria of the Clinical Access Service	
- Presence of blood in 2 different urinalyses results, without recent exercise, menses, sexual activity or instrumentation urinary tract exploration	



Développé par : Dr Maurice Anidjar, Chef du département d'Urologie, et Dr Mark Lipman, Chef du département de la Néphrologie

En collaboration avec : Suzette Chung, inf., Jessica Pinto, inf., MScA, Mélanie Zwetkow, inf. et Bianca Rossignol, inf., Dr Jed Lipes, Vanessa McIntyre, inf.

Version du 6 FÉVRIER 2023

Approuvé par le CMDP du CCOMTL : 6 FÉVRIER 2023