

+Accueil clinique

Algorithme pour saignement vaginal durant le 1^{er} trimestre de grossesse (< 12 semaines)

Professionnel responsable: Infirmière à l'Accueil clinique (AC) de l'Hôpital général juif (HGJ)
Population ciblée: Patiente référée par un médecin de famille / IPS du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CCOMTL) pour un saignement vaginal dans le 1^{er} trimestre de grossesse (< 12 semaines)

Diriger la patiente vers l'Urgence en présence d'un ou des symptômes ou conditions suivants :	
- Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, pouls $\geq 100/\text{min}$, FR $\geq 28/\text{min}$, SpO ₂ $\leq 92\%$	- Étourdissement/syncope
- Saignements > 1 serviette souillée / heure (ss/h) pour 3 heures (hrs) consécutives	- Sous anticoagulothérapie thérapeutique
- Douleur abdominale aigüe non soulagée avec analgésique oral	
Si la patiente est entre 12-19 semaines de grossesse avec saignements vaginaux, SVP la référer à l'échographie (écho) obstétricale et si la patiente est enceinte de > 19 semaines de grossesse, SVP la référer au Centre familial des naissances de l'HGJ	
Critères d'inclusion à l'AC :	
- Répond aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique	
- Grossesse de < 12 semaines avec saignement vaginal	
Rediriger si :	
Rediriger vers la clinique d'évaluation de la grossesse précoce (EPAC) pour la gestion et la suivi d'une grossesse ectopique, une grossesse de localisation indéterminée, ou une grossesse arrêtée diagnostiquée par échographie.	
* Grossesse intra utérin confirmée rediriger la patiente vers ma grossesse ou appelez le 811 option 3 pour obtenir GYNE/OBS*	



