

Service de l'Accueil Clinique : Suspicion De Thrombose Veineuse Profonde (TVP) – Algorithme

Professionnel responsable : Infirmière clinicienne au Service de l'Accueil Clinique (SAC) de l'hôpital général juif.

Population des patients : Les patients référés par les médecins de famille (MD) et/ou les urgentologues et/ou infirmière praticienne (IPS) du CIUSSS du Centre-Ouest de l'île de Montréal (CCOMTL), qui présente des signes cliniques de suspicion de TVP.

Contre-indications spécifiques :	Diriger votre usager vers l'urgence en présence d'un ou des symptômes ou d'une des conditions suivantes :
- Hémorragie cérébrale < 3 mois - Troubles hépatiques ou de coagulopathie - Présentement enceinte ou ayant un test de grossesse positif - Présentement sous anticoagulation depuis > 1 semaine - Fièvre $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$, pouls $\geq 100/\text{min}$, RR $\geq 28/\text{min}$, SaO₂ $\geq 92\%$	- Membre froid et pale ou présentant une paresthésie - Douleur aigue non soulagée avec analgésique - Sous hémodialyse - Douleur thoracique/dyspnée subite ou douleur pleurétique ou hémoptysie
Indication Spécifique:	
- Répond aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique - Le score de Wells & un diagnostic alternatif sont indiqués sur le formulaire de référence	

