

Liste alphabétique des maladies infectieuses nécessitant des précautions additionnelles

Alphabetical Listing of Infectious Diseases requiring Additional Precautions

- Adenovirus
- Adenovirus (conjunctivitis)
- C. difficile*
- Chicken Pox*
- Coqueluche
- Coronavirus
- CRO (Carbapenem resistant)
- Diarrhée / diarrhea (cause inconnue/ unknown cause)
- Diarrhée / diarrhea: Hep. A, E, E.coli, 0157:H7, Campylobacter, Salmonella, Shigella si incontinence ou selles non contenues / if incontinent or uncontained stools
- Diphtérie/Diphtheria
- Ebola - Aviser/Notify IPAC
- SRI/FRI (Fébrile Respiratory Illness/Severe Respiratory Illness) - Aviser/Notify IPAC
- Fièvre et voyage / Fever and travel - Aviser/Notify IPAC
- Gale / gale norvégienne
- GAS (*Group A Streptococcus*)
- Gastroenterite/Gastroenteritis
- Herpes Zoster disseminated*
- Influenza
- Lassa Fièvre/Fever - Aviser/Notify IPAC
- Lice
- Marburg virus - Aviser/Notify IPAC
- MDRO
- Measles-rubeola*
- Meningococque/ meningococcus (*Neisseria meningitidis*) (pneum. ou/or meningit.)
- Metapneumovirus
- MRF/MRS (Maladie Respiratoire Fébrile/ Maladie Respiratoire Sévère) - Aviser/Notify IPAC
- MRSA
- Mumps

- Norovirus
- Oreillons
- Parainfluenza
- Parvovirus B19
- Pertussis
- Peste
- Plague
- Polio
- Poux
- Rhinovirus
- Rotavirus
- Rougeole*
- RSV (Respiratory Syncytial Virus)
- Rubeole/Rubella
- Scabies / Norwegian scabies
- Shingles disseminated*
- Streptocoque/Streptococcus Group A (Streptococcus pyogenes) Invasive/Invasif*
- TB (pulm. ou/or laryng.)
- Varicelle/Varicella*
- VRE
- XDRO
- Zona disseminé*



Consultez le manuel de PCI et le fichier partagé "Infection Prevention" pour plus d'informations.

OU Consultez la PCI pour toute autre maladie qui n'est pas incluse sur cette liste au poste 5778.

Refer to IPAC manual and Shared Drive "Infection Prevention" for more information.

OR Consult IPAC for any disease not on list at 5778.

* Tous les travailleurs de la santé qui n'ont pas eu ces maladies infectieuses ou le vaccin, doivent s'absentir de prendre soins du patient.

* All healthcare workers who have not had these infectious diseases or the vaccine must refrain from taking care of the patient.

LISTE DES AFFICHES DE PRECAUTIONS ADDITIONNELLES avec leur code de couleur

COLOUR-CODED SIGNS FOR ADDITIONAL PRECAUTIONS



Hôpital général juif
Jewish General Hospital

SARM, ERV, CRO, XDRO, etc.	CONTACT CONTACT Blouse, gants. Chambre privée ou cohorte avec autres patients positifs avec MÊME microorganisme	CONTACT CONTACT Gown, gloves. Private room or cohort with patients positive with SAME microorganism	MRSA, VRE, CRO, XDRO, etc.
<i>C. difficile</i> , diarrhée (cause inconnue)	CONTACT PLUS CONTACT PLUS Blouse, gants. Lavez mains avec eau et savon. Chambre privée ou cohorte avec autres patients positifs pour le <i>C.difficile</i> . NE PAS cohorte un patient <i>C.difficile</i> suspect avec un patient <i>C.difficile</i> confirmé.	CONTACT PLUS CONTACT PLUS Gown, gloves. Wash hands with soap and water. Private room or cohort other patients positive for <i>C.difficile</i> . DO NOT cohort rule out <i>C.difficile</i> with a confirmed <i>C.difficile</i> .	<i>C. difficile</i> , diarrhea (unknown cause)
Tuberculose (TB) pulmonaire ou laryngiale, ou plaie ouverte avec TB (suspecte ou confirmée)	AERIENNE AIRBORNE Masque N95. Chambre pression négative.	AERIENNE AIRBORNE N95 mask. Negative pressure room.	Pulmonary or laryngeal tuberculosis (TB) or open wound with TB (suspected or confirmed)
Infections respiratoires virales: Influenza, parainfluenza, VRS, adenovirus, etc. Méningite-méningocoque jusqu'à 24 heures après le début d'une antibiothérapie adéquate Infection invasive au Strep. Groupe A jusqu'à 24 heures après le début d'une antibiothérapie adéquate	CONTACT / GOUTTELETTES CONTACT / DROPLET Blouse, gants, masque chirurgical/procédure, écran facial lorsque 2 mètres du patient. Chambre privée ou cohorte avec autres patients positifs avec MÊME microorganisme.	CONTACT / DROPLET CONTACT / DROPLET Gown, gloves, surgical/procedure mask, faceshield when within 2 meters from the patient. Private room or cohort with patients positive with SAME microorganism.	Respiratory viral infections: Influenza, parainfluenza, RSV, adenovirus, etc. Meningitis-meningococcal until 24 hrs of effective therapy Invasive Group A Strep. infection until 24 hrs of effective therapy
Varicelle (Pour contacts suspects seulement) <i>Si vous n'avez PAS eu la varicelle ou le vaccin, veuillez NE PAS entrer dans la chambre.</i> (Voir protocole) Zona disséminé	CONTACT / AERIENNE CONTACT / AIRBORNE Blouse, gants, masque N95. Chambre à pression négative.	CONTACT / AIRBORNE CONTACT / AIRBORNE Gown, gloves, N95 mask. Negative pressure room.	Varicella: (For susceptible contacts ONLY) <i>If you have NOT had Varicella or the vaccine, please avoid entry into the room.</i> (See protocol) Disseminated herpes zoster (Shingles)
Maladie Respiratoire Fébrile/ Maladie Respiratoire Sévère (MRF/MRS): Nouvelle toux ou dyspnée et fièvre et pneumonie en lien avec le protocole MRF/MRS. Fièvre et histoire de voyage Aviser la PCI.	CONTACT / GOUTTELETTES AÉRIENNE CONTACT / DROPLET AIRBORNE Blouse, gants, masque N95, écran facial. Chambre à pression négative.	CONTACT / DROPLET AIRBORNE CONTACT / DROPLET AIRBORNE Gown, gloves, N95 mask, faceshield. Negative pressure room.	Febrile Respiratory Illness/ Severe Respiratory Illness (FRI/SRI): New cough or dyspnea and fever and pneumonia consistent with FRI/SRI protocol. Fever and travel history Contact IPAC.

PRATIQUER L'HYGIENE DES MAINS MÉTICULEUSEMENT Nettoyer l'équipement après usage.

Veuillez SVP informer la PCI du nom et numéro d'unité d'un patient en précautions ADDITIONNELLES (poste 5778).

CES PRÉCAUTIONS S'AJOUTENT AUX PRATIQUES DE BASE QUI DEVRAIENT ÊTRE APPLIQUÉES POUR TOUS LES PATIENTS LORSQU'EN CONTACT AVEC LE SANG OU LES LIQUIDES BIOLOGIQUES MALGRÉ LEUR DIAGNOSTIQUE ET SONT SUJETTES AU CHANGEMENT SELON LES RECOMMANDATIONS DE LA PCI.



PRACTICE METICULOUS HAND HYGIENE Clean equipment after use

Please inform IPAC of the name and unit number of any patient placed on ADDITIONAL precautions (ext. 5778).

THESE PRECAUTIONS ARE IN ADDITION TO ROUTINE PRACTICES THAT SHOULD BE USED FOR ALL PATIENTS WHEN IN CONTACT WITH BLOOD OR BODY FLUIDS REGARDLESS OF DIAGNOSIS AND MAY CHANGE BASED ON IPAC RECOMMENDATIONS.