Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Québec

Colposcopie

Si vous avez récemment obtenu un résultat anormal à un test Pap, votre professionnel de santé peut recommander une colposcopie de suivi.

Un résultat anormal au test de dépistage du cancer du col de l'utérus (test Pap) signifie que des cellules anormales ont été détectées sur votre col de l'utérus. Les résultats anormaux sont courants et ne signifient pas nécessairement que vous avez un cancer ou des cellules précancéreuses. Un suivi est recommandé afin de déterminer le type de modifications cellulaires.

Qu'est-ce qu'une colposcopie ?

La colposcopie est une procédure utilisée pour examiner votre col de l'utérus et votre vagin. Un médecin utilisera un microscope spécial appelé colposcope pour rechercher d'éventuelles anomalies. Pendant la colposcopie, le médecin peut prélever une biopsie sur les zones qui paraissent anormales.

La colposcopie est-elle douloureuse ?

La colposcopie en elle-même ne devrait pas être douloureuse, mais elle peut être inconfortable. Si une biopsie est réalisée pendant l'examen, vous pourriez ressentir une sensation de pincement ou de crampes.

Quels sont les risques d'une colposcopie ?

Le risque de complications liées à une colposcopie est faible. Cependant, une biopsie peut, dans de rares cas, entraîner une infection ou des saignements.

Que se passe-t-il pendant ma colposcopie ?

1. L'examen commence de la même manière qu'un test Pap : le médecin utilisera un instrument appelé spéculum pour examiner délicatement le vagin et le col de l'utérus.
2. Du vinaigre ou de l'iode peut être appliqué sur votre col de l'utérus afin de mieux visualiser d'éventuelles anomalies.
3. Le médecin prélèvera ensuite une biopsie de votre col de l'utérus pour des analyses complémentaires. La procédure dure entre 5 et 10 minutes.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir procédure de colposcopie :

https://precare.ca/colpo/

Que se passe-t-il après une colposcopie ?

Si une biopsie a été réalisée, de légers saignements peuvent survenir, mais ils devraient s’arrêter dans les 24 à 48 heures. Si un tampon est utilisé pour absorber ces saignements, il doit être retiré trois heures après l’insertion. Si des saignements persistent, un autre tampon peut être inséré ou une serviette hygiénique peut être utilisée.

Comprendre les résultats de votre colposcopie

Bas Grade (LSIL)	Haut Grade (HSIL)
Modifications cellulaires mineures qui disparaissent souvent d’elles-mêmes.	**Modifications cellulaires précancéreuses nécessitant un traitement.**

Mes résultats de colposcopie montrent des modifications cellulaires de bas grade (LSIL). Que dois-je faire maintenant ?

Les modifications cellulaires mineures, comme le LSIL, disparaissent souvent d'elles-mêmes. Un traitement n'est généralement pas nécessaire. Votre médecin vous expliquera les résultats de votre colposcopie et vous informera des éventuelles étapes suivantes.

Mes résultats de colposcopie montrent des modifications cellulaires de haut grade (HSIL 2 ou 3).Que dois-je faire ensuite ?

Votre médecin vous parlera d’une procédure d’excision électrochirurgicale en boucle (LEEP), qui peut être réalisée en clinique de colposcopie. Si elles ne sont pas traitées, les lésions HSIL 2 et HSIL 3 peuvent évoluer en cancer avec le temps.

Quand recevrai-je mes résultats ?

Les résultats de votre colposcopie seront disponibles sous 4 à 5 semaines. Un médecin ou une infirmière de la clinique de colposcopie vous contactera en cas de résultats anormaux pour discuter des prochaines étapes. Les résultats normaux seront transmis à votre médecin traitant avec des recommandations pour les futurs tests Pap.

Où nous trouver

- Pavillon H, 3e étage
  - Entrez par l’entrée du Pavillon H (5790 Côte-des-Neiges)
  - Prenez les ascenseurs du Pavillon H jusqu’au 3e étage
  - Suivez les indications vers la colposcopie

OU

- Depuis le hall du Pavillon K
  - Suivez les indications vers le Pavillon H
  - Vous entrerez dans le Pavillon H au 3e étage
  - Continuez tout droit et suivez les indications vers la colposcopie

Vous pouvez nous contacter au 514 340-7521.