

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Feuillet d'information destiné au patient Protocole : Doxorubicine liposomale pégylée

**Rédaction** : janvier 2004

**Révision** : octobre 2016

MÉDICAMENT	HORAIRE D'ADMINISTRATION
Doxorubicine liposomale pégylée	Perfusion intraveineuse de 60 minutes (sauf la première fois où la perfusion peut durer plus longtemps).
<i>Répéter le traitement aux 4 semaines.</i>	

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Généralités associées à votre traitement

- › Ce médicament est utilisé pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- › Une **prise de sang** sera faite avant chaque cycle de traitement. La dose du médicament pourra être ajustée ou encore le traitement pourra être retardé, si nécessaire, selon le résultat de la prise de sang ou selon les effets indésirables survenus lors du traitement précédent.
- › De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (p. ex. : médication, stress, maladie). Gardez un bon niveau d'activité, mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- › Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent, mais en petites quantités à la fois.
- › Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, de gomme à mâcher sans sucre, etc.
- › La consommation d'**alcool**, en petite quantité, est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- › Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs, dont la fatigue et le stress.
- › **Chez la femme** non ménopausée, la chimiothérapie peut causer une irrégularité ou un arrêt du **cycle menstruel** pendant les traitements. Les menstruations peuvent se régulariser ou recommencer après l'arrêt des traitements. Elles peuvent également cesser de façon permanente. Cependant une grossesse est toujours possible et la prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée. Des effets nocifs au niveau de l'embryon pourraient survenir si le médicament est administré pendant la grossesse. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de la chimiothérapie.
- › Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles,..) pour protéger l'environnement et vos proches.
- › Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de santé naturels et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- › Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription) ou des produits de santé naturels. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Effets indésirables et mesures à prendre

<b>EFFETS INDÉSIRABLES</b>	<b>MESURES A PRENDRE</b>
Des <b>maux de cœur</b> habituellement légers peuvent survenir surtout le jour même et le lendemain de votre traitement.	<ul style="list-style-type: none"><li>› Avant votre traitement, des médicaments pour prévenir les maux de cœur pourraient vous être prescrits. À la maison, vous aurez à prendre des médicaments au besoin pendant 1 à 2 journées ou plus, selon le cas, après votre traitement.</li><li>› Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des maux de cœur ou des vomissements qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.</li></ul>
Selon les personnes, un <b>éclaircissement des cheveux</b> plus ou moins important peut se produire. En général, ceci survient 2 à 3 semaines après le traitement. Cependant, rassurez-vous, les cheveux repousseront à la fin des traitements.	<ul style="list-style-type: none"><li>› Utilisez un shampoing doux.</li><li>› Évitez de brosser les cheveux vigoureusement.</li><li>› Évitez les fixatifs, teintures et permanentes.</li></ul>
Une diminution des <b>globules blancs</b> surviendra environ 2 à 3 semaines après le traitement. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.	<ul style="list-style-type: none"><li>› Lavez-vous les mains souvent.</li><li>› Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses.</li><li>› Signalez-nous rapidement tous signes d'infection (fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez,...).</li><li>› Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre 38,3°C (101°F) une fois ou 38°C (100,4°F) 2 fois à une heure d'intervalle.</li><li>› Évitez la prise d'acétaminophène (Tyléno<sup>®</sup>, Atasol<sup>®</sup>,...) et d'anti-inflammatoire (p. ex : Motrin<sup>®</sup>, Advil<sup>®</sup>, Aleve<sup>®</sup>..) en cas de fièvre.</li></ul>

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

<b>EFFETS INDÉSIRABLES</b>	<b>MESURES A PRENDRE</b>
<p>Un <b>syndrome palmo-plantaire</b> peut survenir durant votre traitement. Vous pourriez avoir des engourdissements, des picotements, de l'enflure, de la rougeur, au niveau de la paume de vos mains et/ou de la plante de vos pieds. Ces symptômes peuvent être parfois accompagnés de desquamation de la peau, de douleur et de formation d'ampoules.</p>	<p><b>Afin de prévenir cet effet :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Évitez de porter des vêtements et des chaussures trop serrés ou trop petits. Portez des semelles absorbantes en mousse, des coussinets en gel pour protéger les points de pression.</li><li>› Épongez vos mains et vos pieds plutôt que frotter la peau pour la sécher.</li><li>› Gardez la peau à l'air libre afin de transpirer le moins possible.</li><li>› Portez des gants de caoutchouc pour laver la vaisselle.</li><li>› Évitez l'eau chaude; lavez vos mains et vos pieds à l'eau tiède.</li><li>› Hydratez la peau régulièrement à l'aide d'une crème épaisse et émolliente non parfumée.</li><li>› Évitez les exercices vigoureux ou d'activités qui mettent les mains et les pieds à rude épreuve.</li></ul> <p><b>Si des symptômes apparaissent :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Si ces effets surviennent et nuisent à vos activités quotidiennes, avisez un membre de l'équipe dès que possible. Ils vous suggéreront des traitements qui pourront aider à vous soulager.</li></ul>
<p>Des <b>ulcères, de la rougeur, de la douleur ou de l'enflure dans la bouche</b> peuvent apparaître suite au traitement.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Brossez-vous les dents régulièrement après chaque repas et au coucher.</li><li>› Utilisez un rince-bouche à base d'eau et de sel avec ou sans soda (bicarbonate de soude). Gargarisez-vous 4 fois par jour après les repas et au coucher. Ne buvez pas et ne mangez pas dans l'heure qui suit votre gargarisme.</li><li>› Les rince-bouches commerciaux <b>sans alcool</b> sont une bonne alternative.</li><li>› Si des ulcères, de la sensibilité ou des rougeurs à l'intérieur de la bouche apparaissent, communiquez rapidement avec un membre de l'équipe.</li></ul>

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

<b>EFFETS INDÉSIRABLES</b>	<b>MESURES A PRENDRE</b>
Des <b>réactions liées à la perfusion</b> de votre médicament peuvent survenir surtout lors du premier traitement. Ces réactions se présentent généralement sous forme de bouffées de chaleur, essoufflement, mal de tête, frissons, mal de dos, sensation de serrement à la poitrine et/ou dans la gorge, chute ou augmentation de pression et enflure du visage. Ces symptômes sont peu susceptibles de se reproduire au cours des traitements suivants.	› Avez immédiatement l'infirmière si l'un de ces symptômes se manifeste durant votre traitement. Des médicaments pourront alors vous être administrés.

### Considération spéciale liée à votre traitement

- Votre **urine** peut prendre une **coloration rougeâtre** la journée même et le lendemain de votre traitement. Ceci est tout à fait normal et correspond à l'élimination de la **doxorubicine liposomale pégylée**; rassurez-vous, ce n'est pas du sang.

Pharmacien : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

entre \_\_\_ h \_\_\_ et \_\_\_ h \_\_\_ (du lundi au vendredi)